

**RAPORT
PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ
LA NIVELUL SEM. II – 2019**

În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g)

Nr Crt	Denumire antibiotic	Intrări	Consum (flacoane)				Total
			Secția Medicină Internă	Secția Pediatrie	Compartiment Chirurgie Generală	Compartiment ATI	
1	Colistina	0	10	-	-	14	10
2	Imipenem-cilastatina	300	-	-	76	85	161
3	Vancomicina	200	-	-	152	72	224
4	Meropenem	200	-	-	10	12	22
5	Targocid	0	-	-	-	8	8
6	Piperacilin/Tazobactam	50			6	6	12

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente:

- ✓ **PEDIATRIE** - nu a existat patologie care să impună utilizarea antibioticelor de rezervă;
- ✓ **MEDICINĂ INTERNĂ** - antibioticele de rezervă au fost folosite după cum urmează:
 - Colistina – 1 pacient Nefrita tubulointerstitala ac., Cistectomie radicala
- ✓ **CHIRURGIE GENERALĂ** - antibioticele de rezervă au fost folosite după cum urmează:
 - **Vancomicina—14 pacienti** (1 pacient abces mana, Sepsis, 9 pacienti DZ, Gangrena, 1 pacient Proctocolita mucoasa, Hemoragie anus si rect, 1 pacient Embolie si tromboza arterelor extremitatilor inferioare, Gangrena, 1 pacient Hernie ombilicala cu obstructive, fara gangrene, 1 pacient Abces cutanat);
 - **Imipenem/cilastatin—4 pacienti** (3 pacienti Diabet zaharat, Gangrena, 1 pacient Colicistita acuta litiazica);
 - **Meropenem—2 pacienti** (1 pacient Colicistita acuta litiazica , 1 pacient Abces cutanat)

- **Piperacilin/Tazobactam – 1 pacient** Colicistita acuta litiazica
- ✓ **A.T.I.** - antibioticele de rezervă au fost folosite după cum urmează:
- **Vancomicina—8 pacienți** (1 pacient Abces mana, 2 pacienti DZ, Gangrena, 1 pacient Abces renal si perirenal fuzat, Sepsis, DZ, 1 pacient Embolie si tromboza arterelor extremitatilor inferioare, Gangrena, 1 pacient Hernie ombilicala cu obstructie, fara gangrena, 1 pacient cu DZ, PNP si AOMI, 1 pacient Ulceratie MI suprainfectate);
 - **Imipenem/Cilastatin—6 pacienți** (1 pacient DZ, Gangrena, 2 pacienti Colicistita acuta litiazica, 1 pacient Tumora maligna pancreas, tumora maligna sec. Ficacat, 1 pacient Tumora maligna colon, tumora maligna sec. Peritoneu, 1 pacient Abces renal si perirenal fuzat, Sepsis DZ II)
 - **Meropenem—2 pacienți** (1 pacient Colicistita acuta litiazica, 1 pacient Abces renal si perirenal fuzat, Sepsis);
 - **Targocid—2 pacienti** ulcer gambier suprainfectat;
 - **Piperacilina/Tazobactam—1 pacient** (1 pacient Colicistita acuta litiazica).

**Dr. Frunză Camelia – Responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor
CPIAAM – Spital orășenesc Sinaia**