

**RAPORT
PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ
LA NIVELUL ANULUI 2017**

În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g)

Nr Crt	Denumire antibiotic	Consum				Total
		Sectia Medicina Interna	Sectia Pediatrie	Compartiment Chirurgie Generala	Compartiment ATI	
1	Colistinsulfat	0	11	0	38	49
2	Imipenem-cilastatin	0	0	39	206	245
3	Vancomicina	3	0	113	23	139

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente :

1. In 2 cazuri a fost utilizata Vancomicina, pentru tratamentul unor infectii cu Clostridium difficile comunitar, izolat din culturi prelevate la internare (Sectia Medicina Interna/ Compartiment ATI) conform metodologiei naționale de abordare a acestei infecții si procedurii interne de prescriere – Anexa 8;
2. In 2 cazuri a fost utilizat Colistinsulfat in administrare inhalatorie pentru consolidarea vindecarii unei infectii cu Pseudomonas comunitar, la 2 pacienti minori cu mucoviscidoza, cu recomandare de continuare a terapiei in teritoriu, din centrul de referinta (Sectia Pediatrie);
3. In restul cazurilor, antibioterapia de rezerva s-a indicat conform procedurii interne de prescriere, pentru infectii cu criterii documentate de focar invaziv, in conditii de risc evolutiv si/sau nosocomial crescut, cu conversie in functie de evolutie sau de rezultatul culturilor (Compartiment Chirurgie Generala/Compartiment ATI).