

**RAPORT
PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ
LA NIVELUL ANULUI 2016**

În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g)

Nr.crt.	Antibiotic	Nr. flacoane achiziționate	Nr. flacoane Consum	Distribuție / secții
1.	Vancomicina	60	35	27 flacoane / ATI 8 flacoane / CHIRURGIE
2.	Colistin	210	132	ATI
3.	Imipenem / Cilastatin	160	122	ATI

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente :

1. A fost izolată o tulpină de Clostridium difficile, pentru care s-a utilizat Vancomicina, conform metodologiei naționale de abordare a acestei infecții și procedurii interne de prescriere – Anexa 8;
2. Alte indicații au fost formulate pentru pacienți internați în Compartimentul ATI, având criterii multiple de risc evolutiv și/sau de infecție cu agenți rezistenți, conform procedurii interne de prescriere a antibioterapiei;
3. Prescrierile au fost însoțite de prelevări de culturi, cu reducerea terapiei, acolo unde au fost izolați germeni cu sensibilitate la antibiotice de linie inferioară, sau când evoluția favorabilă a permis acest lucru.