

**RAPORT
PRIVIND UTILIZAREA ANTIBIOTICELOR DE REZERVĂ
LA NIVELUL SEM. I – 2019**

În conformitate cu OMS 1101/2016, Anexa nr. 1, Cap. II, 2, (g)

Nr Crt	Denumire antibiotic	Intrări	Consum (flacoane)				Total
			Secția Medicină Internă	Secția Pediatrie	Compartiment Chirurgie Generală	Compartiment ATI	
1	Colistina	60	0	0	0	14	14
2	Imipenem- cilastatina	80	0	0	60	81	141
3	Vancomicina	190	0	0	170	56	226
4	Meropenem	90	0	0	14	56	70
5	Targocid	10	0	0	0	5	5

Utilizarea acestora a vizat următoarele considerente:

- ✓ **PEDIATRIE** - nu a existat patologie care să impună utilizarea antibioticelor de rezervă;
- ✓ **MEDICINĂ INTERNĂ** - nu a existat patologie care să impună utilizarea antibioticelor de rezervă;
- ✓ **CHIRURGIE GENERALĂ** - antibioticele de rezervă au fost folosite după cum urmează:
 - **Vancomicina—7 pacienti** (6 pacienți cu diabet zaharat cu angiopatie periferică și gangrenă, 1 pacient cu diabet și abces postoperator tardiv);
 - **Imipenem/cilastatin—2 pacienti** (1 pacientă cu neoplasm col uterin std avansat cu exonerație pelvină și ureterostomie definitivă, itu-rezistentă la antibiotice uzuale, 1 pacient dz cu angiopati și gangrenă);
 - **Meropenem—1 pacient** dz cu angioplastie și gangrene.

✓ **A.T.I.** - antibioticele de rezervă au fost folosite după cum urmează:

- **Vancomicina—6 pacienți** (3 pacienți cu gangrene membru pelvin, dz, FIA cronică, unul cu stent coronarian, 1 pacient cu flegmon membru superior și dz, 1 pacient sepsis cu punct de plecare celulită membru pelvin, FIA cronică, BCI, sechele AVC);
- **Imipenem/Cilastatin—6 pacienți** (2 pacienți cu ocluzie intestinală prin tumoră intestin gros, unul cu app semnificative: dz, FIA cronică, 1 pacient cu erizipeloid membru pelvin stare septica și app ciroză hepatică, 1 pacient cu sepsis cu punct de plecare multiple abcese de părți moi regiune gambă, 1 pacient cu colecistită acută litiazică cu angiocolită, icter mecanic, 1 pacient cu colecistită acută litiazică, hidroptică gangrenoasă perforate cu plastron subhepatic abcedat.);
- **Colistină—1 pacient** cu soc septic cu punct de plecare colecistită acută și ocluzie intestinală prin tumoră cec cu invazie în valva ileocecală;
- **Meropenem—6 pacienți** (1 pacient cu flegmon membru superior, dz, 1 pacient cu ocluzie intestinală prin tumoră intestin gros, 1 pacient cu erizipeloid membru pelvin, stare septică și app ciroza hepatică, 1 pacient cu tromboză hemoroidală suprainfectată, 1 pacient cu sepsis cu punct de plecare infecție de tract urinar, 1 pacient cu gangrene membru pelvin dz, FIA cronică, stent coronarian);
- **Targocid—1 pacient** cu peritonită și sepsis cu punct de plecare colecistită acută gangrenoasă;
- **Piperacilina/Tazobactam—9 pacienți** (1 pacient cu peritonită și sepsis cu punct de plecare colecistită acută gangrenoasă, 1 pacient cu ocluzie intestinală prin tumoră intestin gros, 3 pacienți cu colecistită acută litiazică, hidroptică gangrenoasă perforate cu plastron subhepatic abcedat, 1 pacient cu flegmon ischiorectal posterolateral stg, 1 pacient cu peritonită și sepsis cu punct de plecare apendicită gangrenoasă perforată, 1 pacient cu gangrene membru pelvin, tromboză ax femuro-popliteu, 1 pacient cu sepsis cu punct de plecare pulmonar).

**Dr. Frunză Camelia – Responsabil cu politica de utilizare a antibioticelor
CPIAAM – Spital orășenesc Sinaia**